



[患部]左肺

[手術時間] 10:00:00

一 討伐作戦

.

○ 患者のバイタル値と連続執刀クリア目標タイム

- ◇1人目/左肺/60(75)/残り7:45:00(2分15秒で処置)
- ◇2人目/膵臓/55(75)/残り4:18:00(3分27秒で処置)
- ◇3人目/脾臓/50(75)/残り2:07:00(1分20秒で処置)

| The patient's Life is in your hands | |
|--|------|
| | |
| 1) 1人目の患者 | |
| 胸部を消毒して切開(切開→P24) | 9/ |
| ゴニナナンの貯まっ ジナ(ゴニナナン・1940) |), |
| 2 ブラキオンの腕をつぶす(ブラキオン→P40) | 1 |
| 3 爪の部分に新薬(紫色の液体)を投与し、ガイド | 11 |
| 】 ラインに沿って切開(ブラキオン→P40) | * \ |
| | |
| 4 切り離した3つの爪を摘出して弱らせる | 1 |
| (ブラキオン→P40) | |
| | |
| 5 バイタルを回復(バイタル回復→P23) | - |
| | |
| ⑥ ②~⑤を繰り返しながら、3つの爪を摘出して弱 | 11 |
| らせる(ブラキオン→P40) | |
| | |
| 7 2~0を繰り返しながら、4つの爪を摘出して弱 | 1 |
| らせる(ブラキオン→P40) | |
| 8 ②~⑤を繰り返しながら、4つの爪を摘出してブ | 1 |
| ラキオンを消滅させる | / 1 |
| (ブラキオン→P40) | |
| (75435 140) | |
| 9 胸部の閉創処置を行なう(閉創→P25) | 95 s |
| 1 | |
| 10 2人目の患者 | |
| 腹部の消毒を行ない バイタルを回復させて切開 | 110 |
| (切開→P24) | |
| | |
| 11 ケイルが生み出す裂傷、ソーマが生み出す腫瘍 | 45 |
| を処置しつつ、ケイル×2を焼却 | |
| (ケイル→P38、裂傷→P23、ソーマ→P39) | |
| 12 ソーマが生み出す腫瘍を処置しつつ、ケイル×2 | , |
| を焼却(ケイル→P38、ソーマ→P39) | 4- |
| (BC - 4 - 100 - 100 () - 4 - 100 () | |
| 13 融合したケイルが生み出す裂傷、ソーマが生み出 | 49 |
| す腫瘍を処置しつつ、融合したケイルを焼却 | |
| (ケイル→P38、裂傷→P23、ソーマ→P39) | |
| | |
| 14 ソーマの組織を吸引しつつ、ソーマが生み出す腫 | 00/- |
| 11 人 人の関係の必りロックイン 人が一下が四も原 | 1 0 |

5 分裂した組織をすべて吸引し、コアにダメージを

CADUCEUS NEW BLOOD OFFICIAL GUIDE BOOK

与える(ソーマ→P39)



ブラキオンは爪を切り離したら すぐに摘出したほうが効率が いい。最初は左下→右→ 左上の順に3つ摘出しよう。



2回目の出現では、右→左上 →左下の順に3つのブラキオ ンの爪を摘出する。摘出後 にバイタルを回復させよう。



3回目の出現では、爪が1つ 増える。左下→左上→右→ 真上の順に爪を摘出し、すぐ こバイタルを回復させる。



4回目も4つの爪が出現す る。右→左上→真上→左 下の順に摘出しよう。摘出し ら1人目の執刀が終了



ケイルが腫瘍を生み出しても その処置は後回し。まずはケ イル本体とソーマの生み出す 睡痒を怯却すること。



ケイルにレーザー照射を続け て外に押し出すこと。画面に 「OK」が表示されたらすぐソ マの生み出す腫瘍を焼却。



ケイルは、2回目の「OK」の あとに必ず裂傷を生み出す。 裂傷をすぐに縫合し、レーザ - 照射を続けよう。

16 新たなソーマが出現するまえにバイタルを回復 (バイタル回復→P23) 7 2体のソーマが出現したらコアのない側の組織を 先に吸引(ソーマ→P39) 残ったソーマを①、⑤の手順でコアにダメージを 与える(ソーマ→P39) 01-19 17、18を繰り返し、ソーマを消滅させる (ソーマ→P39) 腹部の閉創処置を行なう(閉創→P25) 3 5 3人目の患者 腹部の消毒を行ない、バイタルを回復させて切開 (切開→P24) ソーマが生み出す腫瘍を焼却しつつ、オニュクス 🕼 炬 の潜伏先場所を特定してコアを露出させる (オニュクス→P40、ソーマ→P39) 23 オニュクスに血清(紫色の液体)を投与 (オニュクス→P40) 4 ダミーに注意し、②、②を繰り返して血清を本体 🛑 🔷 🦠 に2回投与する (オニュクス→P40、ソーマ→P39) 5 毛細血管が発生 🐧 🛮 を繰り返し、血清を2回投与してオニュクスと 📵 🛴 🦠 毛細血管を消滅させる (オニュクス→P40、ソーマ→P39) 27 10~10の手順でソーマを消滅させる 02/-(ソーマ→P39) 50 腹部の閉創処置を行なう(閉創→P25) The patient is saved



バイタルに余裕があれば、ソー マが出現するまでに少し時間 があるので、ケイルが生み出し た腫瘍を処置してもいい。



腫瘍が残っていると次の手 順に進めない。必ずエコー で肺を調べて処置漏れがな いか確認しよう。



オニュクスを発見したらオニュ クスの処置を優先。 腫瘍が 悪化するより、オニュクスを逃 すほうが厳しくなる。



腫瘍が悪化したらオニュクス が潜伏するあいだに処置。ド レーンで患部を吸引し、患部 を切り離して回収しよう。



オニュクスの潜伏先によって 難易度が大きく変わる。前 回と同じような位置に潜伏し てくれれば難しくない。



オニュクスを除去できればあ とはラク。悪化した腫瘍を処 置して これまでと同じように ノーマを消滅させよう。

| COLD | ECI | 6.8 | H29 | OB | 88 | 80 |
|------|-----|-----|-----|----|----|----|

| SPECIAL BONUS 獲得条件 | Easy | Normal | Hard | 倍率 |
|--------------------|------|--------|------|-----|
| Miss 判定無し | | | | 1.3 |
| ○○秒以上残して手術終了 ※ | 30 | 60 | 70 | 1.2 |
| 先端組織を復活させない | | | | 1.2 |
| 硬化した組織の数○○個以下 | 8 | 5 | 3 | 1.3 |

OPERATION RANK

| ランク | Easy | Normal | Hard |
|-----|---------------|---------------|---------------|
| С | 0 ~ 10599 | 0~10999 | 0~11399 |
| В | 10600 ~ 10799 | 11000 ~ 11499 | 11400 ~ 11999 |
| Α | 10800 ~ 10999 | 11500 ~ 11999 | 12000 ~ 12499 |
| S | 11000 ~ | 12000 ~ | 12500 ~ 13999 |
| XS | | _ | 14000 ~ |